<u>מרכז דוידוף</u>

<u>המלצות לקבלת חיסונים למטופלים עם ממאירויות מוצקות</u>

1. ההמלצות הבינלאומיות המעודכנות ל- 2015, בנושא חיסונים, כוללות התייחסות מפורשת לחולי סרטן ולאוכלוסיות מדוכאות חיסון.
2. בישראל, המלצות משרד הבריאות עוקבות אחר ההמלצות עולמיות.
3. מומלץ לחולים אונקולוגיים לקבל <u>חיסון נגד שפעת ונגד דלקת ראות</u>.
4. יש לדעת שהחיסונים הנ"ל **<u>אינם מסכנים</u>** אנשים עם ממאירות (מקומית או מתקדמת), מטופלים המקבלים טיפול מדכא חיסון (כימותרפיה או סטרואידים), מטופלים תחת הקרנות או לאחר ניתוחים.
5. החיסונים **<u>תורמים</u>** למניעת תחלואה ותמותה.
6. חיסון שפעת יינתן מוקדם ככל הניתן <u>בעונת השפעת</u>.
7. כדאי לקבל חיסון נגד דלקת ראות מוקדם ככל הניתן. חולים חדשים: עם האבחנה ורצוי שבועיים לפני התחלת טיפול כימי, קרינתי, וכל טיפול אחר מדכא חיסון. חולים במהלך טיפול: ראה הערה מס. 8.
8. במידה והחיסונים ניתנים בזמן טיפול, אזי, בכדי למנוע חפיפה אפשרית בין תופעות לואי לחיסון לבין ירידת כדוריות לבנות, יש לקבל חיסון רק כשספירת דם תקינה, (**ביום הטיפול או לקראת הטיפול**).
9. החיסונים ניתנים במרפאות הקהילה.
10. **<u>מחלימים מסרטן:</u>** מרגע שסיימו והתרחקו מהטיפול הכימי, הם <u>אינם נחשבים</u> למדוכאי חיסון, ולכן ההמלצות למתן חיסונים לגביהם הן כמו ההמלצות לכלל האוכלוסייה.

מרץ 2016

<u>צוות היגוי</u>: פרופ' סולקס, פרופ' להב, ד"ר רובינוביץ, ד"ר פרל, נגה סלע (אחות מרפאת מחלימים), יעל שטרן (אחות יחידת GI), טל גרנות (אחות יחידת השד).

המידע באתר ובמרכז אינו מהווה יעוץ רפואי או תחליף לייעוץ כזה,

בכל מקרה של בעיה רפואית או הבהרות לגבי המידע שקיבלת יש לפנות לרופא המטפל.